

ČINJENICE O HPV – cjevivu

U zemljama EU i u Hrvatskoj registrirana su dva sigurna i provjerena cjeviva protiv HPV-a

- Četverovalentno HPV cjevivo štiti od zaraze tipovima 6, 11, 16 i 18 čime sprječava: nastanak prekanceroznih promjena te rak vrata maternice, stidnice i rodnice i nastanak genitalnih bradavica
- Dvovalentno HPV cjevivo štiti od zaraze tipovima 16 i 18 čime sprječava nastanak prekanceroznih promjena i rak vrata maternice
- Cjeviva sadrže samo bjelančevine virusa i ne dovode do infekcije.
- Nuspojave cijepljenja su blage i prolazne, najčešće crvenilo, otok i bol na mjestu uboda.
- Cijepljenje se preporuča za djevojčice i djevojke od 9-26 godina
- Najbolje se cijepiti prije početka spolnog života

SPRIJEČI HPV-INFEKCIJU: ZNAJTE, CIJEPLJENJE I PROBIR (PAPA test)

Prevenција je najvažnija u očuvanju zdravlja i kvalitete života.

Učinite najbolji izbor za svoje dijete!

Sve o cijepljenju protiv raka vrata maternice saznajte na www.stampar.hr



GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
POVJERENSTVO GRADA ZAGREBA ZA PREVENCIJU INFEKCIJE HPV-om

**CIJEPLJENJE NIJE DOZVOLA ZA
NEODGOVORNO SPOLNO PONAŠANJE!**



ŠTO JE POTREBNO ZNATI ?

- Cijepljenje nije dozvola za neodgovorno spolno ponašanje
- Cijepljenje ne isključuje liječničke preglede
- Cijepljene djevojke trebaju obavljati redovite ginekološke preglede i PAPA test nakon stupanja u spolne odnose
- Cijepljenje bitno smanjuje vjerojatnost da će se naći abnormalnosti u PAPA-testu.



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR



**PREVENCIJA RAKA
VRATA MATERNICE
I DRUGIH BOLESTI
UZROKOVANIH HPV-om**

PREVENCIJA JE NAJVAŽNIJA U OČUVANJU ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA. - UČINITE NAJBOLJI IZBOR ZA SVOJE DIJETE!

ŠTO TREBA ZNATI O HPV-infekciji

- Danas najčešća spolnoprenosiva bolest i 50% mladih ljudi zarazit će se ovim virusom u dobi od 15-25 godina
- Postoji više od 100 tipova virusa HPV
- HPV tipovi visokog rizika (najčešće 16 i 18) uzrokuju rak vrata maternice, rak rodnice i rak stidnice
- HPV tipovi niskog rizika (6,11) uzrokuju genitalne bradavice

KAKO SE PRENOSI HPV-infekcija?

- HPV se lako prenosi!
- Može se prenijeti bilo kojim oblikom spolnog odnosa
- Upotreba kondoma je dobar način zaštite od mnogih spolnoprenosivih bolesti
- Kondom prevenira 70% HPV-infekcija, jer se HPV može prenijeti i kontaktom dijela kože nezaštićene kondomom



POSLJEDICE HPV – infekcije

- Zaražene osobe dugo vremena nemaju simptome zaraze
- U 2-10% zaraženih osoba doći će do posljedica;
 - nastanak spolnih bradavica
 - nastanak predstadija raka vrata maternice, raka rodnice, stidnice i anusa
- Godišnje u Hrvatskoj obolijeva od raka vrata maternice 360 – 380 žena
- Godišnje u Zagrebu obolijeva od raka vrata maternice 70 žena
- Rak vrata maternice je na drugom mjestu po učestalosti u žena u dobi od 30-49 godina starosti.

POVEĆANI RIZIK OD HPV – infekcije

- Rano stupanje u spolne odnose
- Veći broj partnera
- Oslabljena obrambena sustava
- Prisutnost druge spolne infekcije

KAKO SPRIJEČITI HPV – infekciju?

- Edukacija
- Razgovor u obitelji
- Odgovorno spolno ponašanje
- Preventivni odlasci liječniku
- Cijepljenje

CIJEPLJENJE I VAŠE DIJETE:

- Razgovarajte s djetetom o činjenicama spolnog života
- Cijepljenjem ćete podići kvalitetu života i zdravlja vašeg djeteta

KAKO SE RAZVIJA RAK VRATA MATERNICE

